

# UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2023-2024

MATERIA: MATEMÁTICAS II

E

## INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente <u>cuatro</u> preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen. **Todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas.** 

CALIFICACIÓN: Cada pregunta se calificará sobre 2.5 puntos.

TIEMPO: 90 minutos.

# A.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro  $\lambda$ ,

$$\left(\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 1\\ \lambda - 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda - 1 & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} x\\ y\\ z \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} 1\\ \lambda\\ 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} 0\\ 0\\ 0 \end{array}\right),$$

se pide:

- a) (1.5 puntos) Discutir el sistema en función de los valores de  $\lambda$ .
- b) (1 punto) Resolver el sistema en el caso  $\lambda = 1$  y encontrar, si es posible, una solución con x = 5.

# A.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

- a) (1 punto) Proponga un ejemplo de función polinómica de grado 2 cuya gráfica sea tangente a la recta y=x en el punto (0,0).
- b) (1 punto) Proponga un ejemplo de función polinómica de grado 2 que tenga un máximo relativo en el punto (1,1).
- c) (0.5 puntos) Justifique si una función polinómica de grado 2 puede tener dos extremos relativos en R.

## A.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Sean los puntos P(1, -1, 3) y Q(2, 1, -1):

- a) (1 punto) Determine una ecuación del plano respecto del cual ambos puntos son simétricos.
- b) (1.5 puntos) El segmento PQ es uno de los tres lados del triángulo cuya suma de los cuadrados de las longitudes de sus lados es 34 y el tercer vértice se encuentra en la recta  $r\equiv x-2=y=z$ . Calcule las coordenadas del tercer vértice sabiendo que ninguna de sus coordenadas es nula.

# A.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

En un espacio muestral se tienen dos sucesos incompatibles,  $A_1$  y  $A_2$ , de igual probabilidad 0.4 y se considera  $A_3 = \overline{A_1 \cup A_2}$  (por tanto, la probabilidad de  $A_3$  es 0.2). De cierto suceso B se sabe que  $P(B|A_1) = P(B|A_2)$  y  $P(B|A_3) = 2P(B|A_1)$ . Y de un suceso C independiente de  $A_1$  se sabe que  $P(C|A_2) = 0.3$  y  $P(C|A_3) = 0.6$ . Con estos datos se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de  $B ext{ si } P(B|A_1) = 0.25.$
- b) (1.5 puntos) Calcular la probabilidad de C y determinar si C es independiente de  $A_2$ .

# B.1. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Como es bien sabido, la siguiente igualdad de determinantes

$$\det(A+B) = \det A + \det B$$

no es cierta en general.

a) (0.75 puntos) Si A y B son dos matrices para las que  $\det(A+B) = \det A + \det B$ , pruebe que entonces

$$\det((A+B)^2) = \det(A^2) + \det(B^2) + 2\det(AB).$$

b) (1 punto) Dadas las matrices

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ \alpha & 1 & 0 \\ 2 & -1 & \alpha \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

determine el único valor de  $\alpha$  con el que sí se cumple la igualdad  $\det(C+D) = \det C + \det D$ .

c) (0.75 puntos) Para el valor  $\alpha = -1$ , resuelva el sistema homogéneo de ecuaciones lineales que tiene a C como matriz de coeficientes.

# B.2. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dada la función  $f(x) = x^3 - 3x$ , se pide:

- a) (0.75 puntos) Estudiar si es par o impar y calcular sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
- b) (1.75 puntos) Calcular el área de la región acotada delimitada por las gráficas de f(x) y de g(x) = x(x-3).

## B.3. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Dado el punto P(5, -1, 2) y las rectas:

$$r \equiv \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-0}{1}, \qquad s \equiv \left\{ \begin{array}{ll} x-y & = & 5 \\ x+z & = & 3 \end{array} \right.,$$

se pide:


- a) (1 punto) Estudiar la posición relativa de ambas rectas y hallar la distancia entre ellas.
- b) (1.5 puntos) Determinar una ecuación de la recta que pasa por *P* y corta perpendicularmente a la recta *r*.

# B.4. Calificación máxima: 2.5 puntos.

Antonio y Benito, compañeros de piso, lanzan alternadamente un dardo cinco veces a una diana para decidir quien friega. Friega quien menos veces acierte el centro de la diana. En caso de empate, friegan juntos. Si Antonio acierta el centro de la diana en el  $25\,\%$  de sus lanzamientos y Benito en el  $30\,\%$ , se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que no haga falta llegar al cuarto lanzamiento para decidir quién friega.
- b) (1.5 puntos) Aproximando por una normal, calcular la probabilidad de que Antonio falle el centro de la diana en al menos dos terceras partes de 60 lanzamientos.

# Distribución Normal



Ejemplo: si Z tiene distribución  $N(0,1),\,P(Z<0,45)=0,6736.$ 

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	$0,\!5398$	0,5438	0,5478	$0,\!5517$	0,5557	$0,\!5596$	0,5636	$0,\!5675$	$0,\!5714$	0,5753
0,2	$0,\!5793$	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	$0,\!5987$	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	$0,\!6554$	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	$0,\!6915$	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	$0,\!8159$	0,8186	$0,\!8212$	$0,\!8238$	0,8264	0,8289	0,8315	$0,\!8340$	$0,\!8365$	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	$0,\!8485$	0,8508	$0,\!8531$	0,8554	$0,\!8577$	$0,\!8599$	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	$0,\!8686$	$0,\!8708$	0,8729	$0,\!8749$	0,8770	$0,\!8790$	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	$0,\!8907$	0,8925	0,8944	0,8962	$0,\!8980$	$0,\!8997$	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
	0.0050	0.0055	0.0050	0.0055	0.0050	0.0000	0.0004	0.0000	0.0000	0.0004
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

# **MATEMÁTICAS II**

# CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En cada pregunta, aunque el procedimiento seguido sea diferente al propuesto en el documento soluciones, cualquier argumento válido que conduzca a la solución será valorado con la puntuación asignada.

Los contenidos correspondientes al bloque F se evaluarán transversalmente en cualquiera de los ejercicios. Se penalizará en la calificación de cada respuesta la falta de justificación razonada o de precisión y se valorarán las estrategias, razonamientos y toma adecuada de decisiones.

### A.1.

- a) Estudio correcto de cada caso ( $\lambda=1$ ,  $\lambda=2$  y  $\lambda\neq\{1,2\}$ ): 0.5 puntos por cada uno. Si únicamente se determinan los dos valores críticos ( $\lambda=1$  y  $\lambda=2$ ): 0.25 puntos.
- b) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos. Obtención de la solución con x=5: 0.25 puntos.

#### A.2.

a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.25 puntos.b) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

c) Justificación: 0.5 puntos.

#### A.3.

a) Planteamiento : 0.5 puntos. Obtención de la ecuación del plano: 0.5 puntos.

b) Planteamiento: 1 punto. Obtención del punto: 0.5 puntos.

### A.4.

- a) Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 0.5 puntos.
- **b)** Cálculo de la probabilidad de C: 1 punto (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.5 puntos). Determinación de la independencia entre C y  $A_2$ : 0.5 puntos (planteamiento: 0.25 puntos; determinación correcta: 0.25 puntos).

#### B.1.

- a) Usar correctamente la hipótesis y la propiedad del determinante respecto el producto de matrices cuadradas: 0.5 puntos. Finalizar usando que  $\det(A+B)\det(B)=2\det(AB)$ : 0.25 puntos.
- b) Planteamiento 0.5 puntos. Resolución 0.5 puntos.
- c) Discutir el sistema: 0.25 puntos. Planteamiento de la resolución: 0.25 puntos. Solución: 0.25 puntos.

### B.2.

- a) Comprobar que es impar: 0.25 puntos. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento: 0.5 puntos.
- **b)** Intersección de las dos gráficas: 0.5 puntos. Determinación de la integral a calcular: 0.5 puntos. Cálculo de la primitiva: 0.5 puntos. Resolución: 0.25 puntos.

## **B.3.**

- **a)** Determinar la posición correcta de las rectas: 0.5 puntos. Cálculo correcto de la distancia entre las rectas: 0.5 puntos.
- b) Planteamiento: 1 punto. Obtención correcta de la ecuación de la recta: 0.5 puntos.

## B.4.

- a) Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.25 puntos.
- **b)** Cálculo de los parámetros de la normal: 0.5 puntos. Cálculo de la probabilidad: 1 punto (planteamiento: 0.5 puntos; resolución: 0.5 puntos; en el caso de no aplicar la corrección por continuidad o aplicarla incorrectamente, se restarán 0.25 puntos).