

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Después de leer atentamente el examen, responda razonadamente a cinco preguntas cualesquiera a elegir entre las diez que se proponen.

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Cada pregunta se calificará sobre 2 puntos.

A.1. (2 puntos)

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 5a \\ a & 3 \end{pmatrix}$ con $a \in \mathbb{R}$.

- Determine los valores del parámetro a para los que se verifica la igualdad $A^2 - 5A = -I$, donde I es la matriz identidad.
- Calcule A^{-1} para $a = -1$.

A.2. (2 puntos)

Un vivero elabora dos tipos de sustratos. Para elaborar 1 m³ del tipo A necesita 60 kg de tierra vegetal y 30 horas de trabajo. Para elaborar 1 m³ del tipo B necesita 50 kg de tierra vegetal y 50 horas de trabajo. El vivero dispone como máximo de 21000 kg de tierra vegetal y 15000 horas de trabajo. Además, la cantidad de metros cúbicos que elabora de tipo A debe ser como mucho cinco veces la cantidad de tipo B. Por la venta de cada metro cúbico de tipo A obtiene un beneficio de 50 € y 60 € por cada metro cúbico de tipo B.

- Represente la región del plano determinada por las restricciones anteriores y determine las coordenadas de sus vértices.
- Determine cuántos metros cúbicos de cada tipo deben elaborarse para, respetando las restricciones anteriores, maximizar el beneficio. Obtenga el valor del beneficio máximo.

A.3. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{2x^2 + 1} & \text{si } x < 1 \\ 2m + \ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

- Estudie los valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$ y calcule la derivada de la función para $x < 1$.
- Halle el área de la región del plano limitada por la curva $y = f(x)$, las rectas $x = -1$ y $x = 0$ y el eje OX .

A.4. (2 puntos)

Sean A y B sucesos de un experimento aleatorio tales que: $P(A|B) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ y $P(A) = \frac{2}{3}$. Calcule:

- $P(A \cup \overline{B})$.
- $P((\overline{A} \cap B) \cup (\overline{B} \cap A))$.

Nota: $\overline{S}$ denota el suceso complementario del suceso S .

A.5. (2 puntos)

El peso de una patata, en gramos (g), de una remesa que llega a un mercado se puede aproximar por una variable aleatoria X con distribución normal de media μ y desviación típica $\sigma = 60$ g.

- Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de μ sea menor que 20 g, con un nivel de confianza del 95 %.
- Suponiendo que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 100$, calcule el valor de la media μ para que $P(\overline{X} \leq 220) = 0,9940$.

B.1. (2 puntos)

Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro $a \in \mathbb{R}$:

$$\left. \begin{array}{rcl} x - ay & = & 1 \\ ax - 4y - z & = & 2 \\ 2x + ay - z & = & a - 4 \end{array} \right\}$$

- a) Discuta el sistema para los diferentes valores de a .
- b) Resuelva el sistema para $a = 3$.

B.2. (2 puntos)

Se considera la función real de variable real definida por

$$f(x) = \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5}$$

- a) Calcule el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x)$ tenga una asíntota horizontal en $y = -1$.
- b) Para $a = 1$, halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de $f(x)$ y los extremos relativos, si existen.

B.3. (2 puntos)

Dada la función real de variable real

$$f(x) = e^{2x} + x$$

- a) Determine la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en $x = 0$.
- b) Calcule

$$\int_0^1 f(x) dx$$

B.4. (2 puntos)

En un instituto se decide que los alumnos y alumnas solo pueden utilizar un único color (azul o negro) al realizar los exámenes. Dos de cada tres exámenes están escritos en azul. La probabilidad de que un examen escrito en azul sea de una alumna es de 0,7. La probabilidad de que un examen esté escrito en negro y sea de un alumno es 0,2. Se elige un examen al azar. Determine la probabilidad de que

- a) Sea el examen de un alumno.
- b) Sabiendo que está escrito en negro, sea de un alumno.

B.5. (2 puntos)


Una persona se ha propuesto salir a caminar todos los días realizando el mismo recorrido y cronometrando el tiempo que tarda en completarlo. El tiempo que está caminando por este recorrido puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal cuya desviación típica es 10 minutos.

- a) Utilizando la información de una muestra aleatoria simple, se ha obtenido el intervalo de confianza $(26.9, 37.1)$, expresado en minutos, para estimar el tiempo medio que tarda en realizar el recorrido, μ , con un nivel de confianza del 98,92 %. Obtenga el tamaño de la muestra elegida y el valor de la media muestral.
- b) Si el tiempo medio para completar el recorrido es $\mu = 30$ minutos, calcule la probabilidad de que, en una muestra de 16 días elegidos al azar, esta persona tarde entre 25 y 35 minutos de media para completar el recorrido.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

ÁREAS BAJO LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL ESTÁNDAR

Los valores en la tabla representan el área bajo la curva normal hasta un valor positivo de z .



z	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9954	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

ATENCIÓN: La calificación debe hacerse en múltiplos de 0,25 puntos

Ejercicio A.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los términos de la ecuación 0,50 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la inversa 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la inversa 0,75 puntos

Ejercicio A.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta de las restricciones 0,25 puntos.

Representación correcta de la región factible 0,50 puntos.

Obtención correcta de los vértices 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión correcta de la función objetivo 0,25 puntos.

Encontrar el punto de valor máximo (abscisa y ordenada) 0,50 puntos.

Determinación correcta del máximo de la función 0,25 puntos.

Ejercicio A.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la condición de continuidad 0,25 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la derivada 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la integral y los límites de integración 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la integral definida 0,25 puntos

Ejercicio A.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Ejercicio A.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del tamaño 0,25 puntos.

Cálculo correcto del tamaño de la muestra 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la media 0,50 puntos.

SOLUCIONES _ REPERTORIO 6

Ejercicio A.1.

a)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -6 + 5a^2 & 0 \\ 0 & -6 + 5a^2 \end{pmatrix}}_{A \cdot A - 5A} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{B \cdot C}$$
$$\implies a^2 = 1 \implies a = \pm 1$$

b) Como $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1$, se sigue que A es invertible y, puesto que en este caso se verifica que


$$A(-A + 5I) = I, \text{ obtenemos que } A^{-1} = -A + 5I \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio A.2.

Sea x la cantidad de m^3 de sustratos de tipo A e y la cantidad de m^3 de sustratos de tipo B . Entonces:

$$S = \{6x + 5y \leq 2100, 30x + 50y \leq 1500, x \leq 5y, x \geq 0, y \geq 0\},$$

con vértices $A = (300, 60)$, $B = (200, 180)$, $C = (0, 300)$ y $D = (0, 0)$.



Evaluamos la función coste $B(x, y) = 50x + 60y$ en los vértices de la región factible obtenidos:

- $B(300, 60) = 18600$.
- $B(200, 180) = 20800 \Rightarrow \text{Máximo}$
- $B(0, 300) = 18000$
- $B(0, 0) = 0$

El máximo beneficio es 20800 euros y se obtiene elaborando 200 m^3 de sustratos de tipo A y 180 m^3 de sustratos de tipo B.

Ejercicio A.3.

a) Para que la función sea continua en $x = 1$ necesitamos que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{2x^2 + 1} = 2$$

coincida con

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2m + \ln x) = 2m.$$

Concluimos que $m = 1$ para que $f(x)$ sea continua en $x = 1$.

$$\text{La derivada } f'(x) = \frac{-12x^2 + 6}{(2x^2 + 1)^2} \text{ para todo } x < 1$$

b) Puesto que la función es negativa en el intervalo $[-1, 0]$, el área es

$$\left| \int_{-1}^0 \frac{6x}{2x^2 + 1} dx \right| = \left| \left[\frac{3}{2} \ln(2x^2 + 1) \right]_{-1}^0 \right| = \frac{3}{2} \ln(3) u^2$$

Ejercicio A.4. a) teniendo en cuenta que

$$P(\overline{B} \cup A) = P(\overline{B}) + P(A) - P(\overline{B} \cap A)$$

$$P(A \cap \overline{B}) + P(B \cap A) = P(A) \text{ y } P(B \cap A) = P(A|B)P(B) = 1/24$$

se sigue que

$$P(A \cap \overline{B}) = 2/3 - 1/24 = 15/24 = 5/8 \implies P(\overline{B} \cup A) = 5/6 + 2/3 - 5/8 = 7/8.$$

b) Como $\overline{A} \cap B$ y $\overline{B} \cap A$ son disjuntos se tiene que

$$\begin{aligned} P((\overline{A} \cap B) \cup (\overline{B} \cap A)) &= P(B \cap \overline{A}) + P(\overline{B} \cap A) = \\ &= P(\overline{A}|B)P(B) + P(A|\overline{B})P(\overline{B}) = 1/8 + 5/8 = 3/4 \end{aligned}$$

Ejercicio A.5.

a) El error es $E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \frac{60}{\sqrt{n}} < 20 \implies \sqrt{n} > 5.88 \implies n \geq 35$. Por lo tanto se tiene que tomar una muestra de tamaño 35 como mínimo.

b)

$$P(\overline{X} \leq 220) = P(\overline{Z} \leq \frac{220 - \mu}{6}) = 0.9940 \implies \frac{220 - \mu}{6} = 2.51 \implies \mu = 220 - 15.06 = 204.94$$

SOLUCIONES REPERTORIO

Ejercicio B.1.

a) La matriz de coeficientes del sistema es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -a & 0 \\ a & -4 & -1 \\ 2 & a & -1 \end{pmatrix}$$

Cuyo determinante es $|A| = -a^2 + 3a + 4$.

Por lo tanto:

- Si $a \neq -1$ y $a \neq 4 \implies rg(A) = 3, rg(\bar{A}) = 3 \implies$ SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO.
- Si $a = 4 \implies rg(A) = 2$ y $rg(\bar{A}) = 2$ (La segunda ecuación es la tercera más dos veces la primera) $\implies$ SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO.
- Si $a = -1 \implies rg(A) = 2 \neq rg(\bar{A}) = 3 \implies$ SISTEMA INCOMPATIBLE.

b) Para $a = 3$ el sistema es compatible determinado. Resulta:

$$\left. \begin{array}{l} x - 3y = 1 \\ 3x - 4y - z = 2 \\ 2x + 3y - z = -1 \end{array} \right\}$$

Aplicando por ejemplo el método de Cramer o el de Gauss obtenemos que la solución es:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-1}{2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-1}{2}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{-3}{2}$$

Ejercicio B.2.

Dominio de f es el conjunto $\mathbb{R} - \{x : x^2 - 5 = 0\} = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{5}\}$

a) Para que f tenga una asíntota horizontal en $y = -1$ se debe cumplir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5} = a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{ax^2 - 3}{x^2 - 5}$$

Se sigue que $a = -1$

b) para $a = 1$ tenemos que

$$f'(x) = \frac{-4x}{(x^2 - 5)^2} = 0 \implies f'(x) = 0 \implies x = 0.$$

Mirando ahora el signo de la derivada:

- $(-\infty, -\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 0)$ la derivada es positiva y por tanto la función creciente.
- En $(0, \sqrt{5}), (\sqrt{5}, \infty)$ la derivada es negativa y por tanto la función es decreciente.
- En $x = 0$ hay un máximo.

Ejercicio B.3.

a) Calculamos la derivada

$$f'(x) = 2e^{2x} + 1 \implies f'(0) = 3 \implies y - 1 = 3x \implies y = 3x + 1$$

b)

$$\int_0^1 (e^{2x} + x) dx = \left| \frac{e^{2x}}{2} + \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{e^2}{2}$$

Ejercicio B.4. Denotamos a negro, azul, chico y chica por N, A, Y , y X respectivamente. Sabemos además que $P(N) = 1/3, P(A) = 2/3, P(X|A) = 7/10$ y $P(Y \cap N) = 1/5$

a)

$$P(Y|N) = \frac{P(Y \cap N)}{P(N)} = 3/5$$

b) Como $P(Y|A) = 3/10$ se tiene que

$$P(Y) = P(Y|A)P(A) + P(Y \cap N) = 2/5$$

Ejercicio B.5.

a) $X \sim N(\mu, \sigma = 10), I_\mu = (26'9, 37'1)$. Como $\bar{x} = \frac{26'9 + 37'1}{2} = 32$ se sigue que el error, $E = 5'1$.
Teniendo en cuenta que $z_{\alpha/2} = 2'55 \implies$

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \implies 2'55 \frac{10}{\sqrt{n}} = 5'1 \implies n = \left(\frac{25'5}{5'1} \right)^2 = 25.$$

b) $X \sim N(30, 10) \implies \bar{X} \sim N(30, 2'5) \Leftrightarrow Z = \frac{\bar{X} - 30}{2'5} \sim N(0, 1)$. Entones

$$P(25 \leq \bar{X} \leq 35) = P(-2 \leq Z \leq 2) = 2P(Z \leq 2) - 1 = 0'9544.$$

Ejercicio B.1. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Cálculo correcto de los valores críticos..... 0,50 puntos.

Discusión correcta..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Solución correcta del sistema 1,00 punto.

Ejercicio B.2. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto del límite..... 0,25 puntos.

Resolución correcta del límite 0,50 puntos.

Obtención correcta del parámetro 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la derivada..... 0,25 puntos.

Obtención de los intervalos de crecimiento y decrecimiento 0,50 puntos.

Obtención de los extremos relativos 0,25 puntos

Ejercicio B.3. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Expresión correcta de la ecuación de la recta tangente 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la pendiente de la tangente 0,50 puntos.

Ecuación correcta de la recta tangente 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Cálculo correcto de la integral indefinida 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la integral definida 0,50 puntos

Ejercicio B.4. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Planteamiento correcto de la probabilidad 0,50 puntos.

Cálculo correcto de la probabilidad..... 0,50 puntos.

Ejercicio B.5. (Puntuación máxima: 2 puntos)

Apartado (a): 1 punto

Cálculo correcto de $z_{\alpha/2}$ 0,25 puntos.

Expresión correcta de la fórmula del tamaño 0,25 puntos.

Cálculo correcto del tamaño de la muestra..... 0,25 puntos.

Cálculo correcto de la media muestral 0,25 puntos.

Apartado (b): 1 punto.

Expresión de la distribución de la media muestral 0,25 puntos.

Tipificación correcta de la variable 0,25 puntos.

Obtención correcta de la probabilidad..... 0,50 puntos.